



## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

# SmectaGo®

(СмектаГоу)

Готова за пиене суспензия в сашета, съдържаща диосмектит

Прочетете внимателно листовката, преди да започнете да приемате този продукт, защото тя съдържа важна информация за вас. Листовката е изготвена, за да ви помогне да използвате правилно този продукт. Ако имате други въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка, защото може да се наложи да я прочетете отново.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява SmectaGo® и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемате SmectaGo®
3. Как да приемате SmectaGo®
4. Възможни нежелани реакции на SmectaGo®
5. Как да съхранявате SmectaGo®
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. Какво представлява SmectaGo® и за какво се използва

СмектаГоу представлява медицинско изделие – готова за пиене суспензия в саше като еднократна доза за перорално приложение.

СмектаГоу е предназначен за:

- лечение на остра диария при **възрастни и деца над 8 години**.  
При деца лечението на остра диария трябва да е съпроводено с приемане на перорален рехидратиращ разтвор, за да се предотврати обезводняване
- лечение на хронична диария или стомашни болки при **възрастни**.

Основната съставка на СмектаГоу е диосмектит. Диосмектитът представлява естествена глина, която помага за спирането и лечението на диария и облекчаване на стомашните болки. Доказано е, че той:

- се свързва с токсините и микроорганизмите (бактерии и вируси) и помага за тяхното отстраняване от тялото;
- предпазва стомашно-чревния тракт и спомага за възстановяването на стомашно-чревни увреждания с естествените си покривни свойства.

Ефикасността на диосмектит е доказана чрез клинични проучвания.

### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемате SmectaGo®

#### Не приемайте СмектаГоу:

- ако сте алергични към диосмектит или към някоя от другите съставки (вижте Раздел 6: „**Съдържание на опаковката и допълнителна информация**“);
- при деца под 8 годишна възраст с остра диария;
- при деца с хронична диария или стомашни болки.

#### Специални предупреждения и предпазни мерки за това медицинско изделие

#### Не се опитвайте да лекувате симптомите сами и незабавно се посъветвайте с Вашия лекар, ако:

- диарията е придружена от висока температура, треска или многократно повръщане;
- имате признаци на обезводняване (ако изпитвате силна жажда, сухота на езика, отпадналост или трайна загуба на апетит);
- изпражненията ви съдържат кръв или слуз;
- диарията е придружена с внезапна загуба на телесно тегло;
- диарията се появява по време на лечение с антибиотици или след него;
- имате установена имунна недостатъчност или в момента сте подложен на лечение, което потиска имунната система на организма (с имunosупресори или лечение на рак);
- наскоро сте се завърнали от пътуване в тропическа страна.

#### Не продължавайте да лекувате диарията и се посъветвайте с Вашия лекар, ако:

- Симптомите не се подобряват или се влошават след препоръчителната продължителност на лечението (вижте Раздел 3: „**Как да приемате СмектаГоу**“).

- Диарията често се появява отново или изпитвате редуващи се пристъпи на диария и запек.

#### Вземете специални предпазни мерки със СмектаГоу:

- СмектаГоу трябва да се използва с внимание от пациенти, които са имали остър запек;
- СмектаГоу съдържа малки количества етанол (етилон алкохол), под 100 mg на дневна доза.

#### Предупреждения за пациенти с остра диария

- При деца СмектаГоу трябва да се използва заедно с перорален рехидратиращ разтвор (ПРР) за компенсиране на изгубените от диарията течности и за да се предотврати обезводняване.

Деца трябва да приемат редовно храна, докато диарията продължава. Препоръчително е да се приемат често малки порции от смесени храни (например ориз, яйца, месо, готвени плодове и зеленчуци).

Ако детето изпитва промени в поведението, ако симптомите на диарията не се подобряват или се влошават, или има често или постоянно повръщане, се обърнете към Вашия лекар.

- Привъзрастни сострададиария СмектаГоу е съпътстващо лечение към рехидратирането с вода за компенсиране на изгубените от диарията течности. Докато диарията продължава, трябва да се приема редовно храна. Препоръчително е да се приемат плодови сокове или малки порции от леки храни без мазни, тежки, пикантни, стимулиращи съставки.

Лечението на диария при пациенти в напреднала възраст или пациенти с крехко здраве изисква специално внимание, тъй като диарията може да доведе до значителна загуба на течности (обезводняване), която може да има тежки последици.

#### Предупреждения за хронична диария или стомашни болки

Продължително или многократно приемане на СмектаГоу не е препоръчително. При хронична диария или стомашни болки, ако симптомите продължават повече от две седмици, се посъветвайте с Вашия лекар, за да се установят първопричините, преди да може лечението да продължи.



### Други лекарства и СмектаГоу

Не приемайте СмектаГоу едновременно с други перорално приемани лекарства, за да не намалите ефективността на другото лечение. Препоръчително е да има интервал от 2 часа между приемането на други лекарства и СмектаГоу.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства или медицински изделия, включително отпускани без рецепта.

### Бременност и кърмене

СмектаГоу® може да се използва от бременни жени и кърмачки, но се препоръчва да се посъветвате с Вашия лекар, преди да приемате СмектаГоу®.

### 3. Как да приемате SmectaGo

#### Начин на приемане:

Това медицинско изделие се приема перорално и е готово за пиене. Съдържанието на сашето може да се поглъща направо. Разтъркайте сашето, преди да го отворите. Всяко саше се използва само веднъж след отварянето.

#### Препоръчителна дозировка

##### • Остра диария

| Възраст                              | Доза  |
|--------------------------------------|---|
| Деца (от 8 до 15 години включително) | 2 сашета първоначално, след това по 1 саше след всяко течно изхождане, до 4 сашета на ден<br><b>Трябва да се приема перорален рехидратиращ разтвор (ПРР) за компенсиране на изгубените от диарията течности и предотвратяване на обезводняване.</b> |
| Възрастни и деца над 15 години       | 2 сашета първоначално, след това по 1 саше след всяко течно изхождане, до 6 сашета на ден   |

**Колко дълго се приема СмектаГоу® при остра диария**

Можете да използвате СмектаГоу до 3 дни. Ако диарията продължи повече от 3 дни, се посъветвайте с Вашия лекар.

##### • Хронична диария или стомашни болки:

| Възраст          | Доза   |
|------------------|--|
| Възрастни (само) | До 3 сашета на ден (1 сутрин, 1 на обяд, 1 вечер), ако е необходимо. |

**Колко дълго се приема СмектаГоу при хронична диария или стомашни болки**

Можете да използвате това медицинско изделие **само до 2 седмици**, без да потърсите медицинска консултация. Продължително или многократно приемане на СмектаГоу не е препоръчително.

#### Ако забравите да приемете СмектаГоу

Ако забравите да приемете доза, приемете я след следващото течно изпразнение (изхождане). Не превишавайте препоръчваната дневна доза.

### 4. Възможни нежелани ефекти

Най-често срещаната нежелана реакция по време на лечението е **запек**. При поява на запек лечението трябва да се прекрати и ако е необходимо, да започне отново с по-малка дневна доза. Някои други по-рядко срещани нежелани реакции са обрив, уртикария (копривна треска), пруритус (сърбеж) и ангиоедем (алергична реакция, която причинява подуване на кожата, устните, гърлото и езика).

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, или ако някоя от нежеланите реакции продължава по-дълго време, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### 5. Как да съхранявате SmectaGo®

Да се пази на място, недостъпно за деца.

СмектаГоу не трябва да се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Няма специални условия на съхранение за това медицинско изделие.

### 6. Съдържание на опаковката и друга информация

Основната съставка в СмектаГоу е диосмектит, по 3 g на саше. Другите съставки са: овкусител карамел и какао\*, гума ксантан, лимонена киселина монохидрат, аскорбинова киселина, калиев сорбат, сукралоза, пречистена вода.

\*Състав на овкусителя карамел и какао: смес от естествени и синтетични овкусители, карамелен оцветител E 150d, карамелизиран захарен сироп, пропиленгликол E1520, вода, етанол, кофеин.

Производител:



Ipsen Pharma  
65 quai Georges Gorse  
92100 Boulogne-Billancourt  
Франция

Телефон: +33 (0)1 58 33 00 00

Последна редакция: май 2017 г.

CE 0426

IPSEN